

FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA O MACC – CRIANÇA

1 - IDENTIFICAÇÃO:

Nome: _____
Data de Nasc.: ____/____/____ Idade: ____ Celular: (____) _____
Unidade de Saúde: _____ ACS responsável: _____
Município: Toledo UF: PR

2- ESTRATIFICAÇÃO AO NASCER (0-29 DIAS)

RISCO INTERMEDIÁRIO (AO NASCER):

Filhos de mães:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> infecção intrauterina (sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus e zika vírus) + HIV | <input type="checkbox"/> Que apresentam exantema durante a gestação atual |
| <input type="checkbox"/> em situações de vulnerabilidade: em situação de rua, indígenas, quilombolas ou migrantes | <input type="checkbox"/> Com gravidez indesejada (quando há dificuldade na aceitação da gravidez) |
| <input type="checkbox"/> Negras | <input type="checkbox"/> Com histórico de óbito (com 3 abortos consecutivos em qualquer idade gestacional) ou natimorto (em gestação maior de 20 semanas) ambos em gestação anterior |
| <input type="checkbox"/> com menos de 4 consultas de pré natal | <input type="checkbox"/> Com histórico de violência interpessoal |
| <input type="checkbox"/> Com menos de 15 ou mais de 40 anos | <input type="checkbox"/> Que morreram no parto |
| <input type="checkbox"/> Com menos de 20 anos e mais de 3 partos | <input type="checkbox"/> Com óbito de irmão menor de 5 anos por causas evitáveis |
| <input type="checkbox"/> Baixa escolaridade ou com menos de 3 anos de estudo | |

E/OU com características de nascimento:

- Peso ao nascer $\geq 2.000g$ e $< 2.500g$
 Idade gestacional ≥ 35 e < 37 semanas
 Anomalias congênitas menores (ex.: fossetas, apêndices pré-auriculares, polidactilias do tipo de apêndices digitiformes, hipospadias de 1º grau ou balcânicas, mamas extranumerárias, nervos pigmentados)

ALTO RISCO (AO NASCER):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> peso ao nascer $> 2.000g$ e $\geq 4.000g$ | <input type="checkbox"/> Malformações congênitas graves (Graves alterações anatômicas, estéticas e funcionais podendo levar à morte. Exemplos: lábio leporino com ou sem palato fendido, sindactilias e microtias, Síndrome de Down, síndrome de Patau, anencefalia, cardiopatia congênita, etc) |
| <input type="checkbox"/> Idade gestacional ≤ 34 semanas | |
| <input type="checkbox"/> Asfixia perinatal (APGAR < 7 no 5º minuto) | |
| <input type="checkbox"/> Hiperlibirunemia com exsanguinotransusão | |
| <input type="checkbox"/> doenças genéticas, cromossopatias (ex.: Síndrome de Down) | |

3 -ESTRATIFICAÇÃO ENTRE 1 MÊS E 2 ANOS

RISCO INTERMEDIÁRIO (ENTRE 1 MÊS E 2 ANOS):

Filhos de mães:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> infecção intrauterina (sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus e zika vírus) + HIV | <input type="checkbox"/> Mãe sem suporte familiar (sem rede de apoio para o cuidado com a criança) |
| <input type="checkbox"/> em situações de vulnerabilidade: em situação de rua, indígenas, quilombolas ou migrantes | <input type="checkbox"/> Chefe da família sem fonte de renda |
| <input type="checkbox"/> Negras | <input type="checkbox"/> Depressão pós-parto e/ou baby blues (diagnostico atual ou progresso) |
| <input type="checkbox"/> com menos de 4 consultas de pré natal | <input type="checkbox"/> Um dos pais com: transtorno mental severo, deficiência física e/ou doença neurológica |
| <input type="checkbox"/> Com menos de 15 ou mais de 40 anos | <input type="checkbox"/> Pais com dependência de álcool e outras drogas. |
| <input type="checkbox"/> Com menos de 20 anos e mais de 3 partos | <input type="checkbox"/> Mãe ausente por doença, abandono ou óbito |
| <input type="checkbox"/> Baixa escolaridade ou com menos de 3 anos de estudo | <input type="checkbox"/> Com histórico de violência interpessoal |
| <input type="checkbox"/> Que apresentam exantema durante a gestação atual | <input type="checkbox"/> Cuidador não habilitado para o cuidado com o RN (avaliar durante a visita se há indícios de violação dos direitos da criança) |
| <input type="checkbox"/> Com gravidez indesejada (quando há dificuldade na aceitação da gravidez) | <input type="checkbox"/> Sem acesso a saneamento básico e/ou água potável |
| <input type="checkbox"/> Com gravidez decorrente de violência sexual | |
| <input type="checkbox"/> Com histórico de óbito (com 3 abortos consecutivos em qualquer idade gestacional) ou natimorto (em gestação maior de 20 semanas) ambos em gestação anterior | |

E/OU com características de nascimento:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Peso ao nascer $\geq 2.000g$ e $< 2.500g$ | <input type="checkbox"/> Desnutrição ou curva ponderoestadural estacionária ou em declínio e/ou carências nutricionais ou sobrepeso |
| <input type="checkbox"/> Idade gestacional ≥ 35 e < 37 semanas | <input type="checkbox"/> Criança não vacinada ou com esquema vacinal atrasado |
| <input type="checkbox"/> Anomalias congênitas menores (ex.: fossetas, apêndices pré-auriculares, polidactilias do tipo de apêndices digitiformes, hipospadias de 1º grau ou balcônicas, mamas extranumerárias, nervos pigmentados) | <input type="checkbox"/> Cárie |
| <input type="checkbox"/> internação ou intercorrência na maternidade ou em unidade neonatal | <input type="checkbox"/> Criança com 3 ou mais atendimentos em pronto atendimento e um período de 3 meses. |
| <input type="checkbox"/> Criança sem realização de triagem neonatal | |

ALTO RISCO (ENTRE 1 MÊS E 2 ANOS):

Quem é a criança:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Peso ao nascer $< 2.000g$ e $\geq 4.000g$ | congênita, etc), cromossômicas (síndrome de Down) e doenças metabólicas com repercussão clinic; |
| <input type="checkbox"/> Prematuridade ≤ 34 semanas | <input type="checkbox"/> testes de triagem neonatal alterados (teste da orelinha, olhinho, coraçãozinho e do pezinho. |
| <input type="checkbox"/> Asfixia perinatal (APGAR < 7 no 5º minuto) | <input type="checkbox"/> Desenvolvimento psicomotor insatisfatório para a faixa etária (conforme caderneta da criança) |
| <input type="checkbox"/> Hiperlibirunemia com exsanguinotransusão, infecção crônicas do grupo STORCH (sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus e zika vírus) + HIV + zika confirmadas ou em investigação | <input type="checkbox"/> sinais de violência/maus tratos |
| <input type="checkbox"/> Doença gnética, malformações congênitas graves (Graves alterações anatômicas, estéticas e funcionais podendo levar à morte. Exemplos: lábio leporino com ou sem palato fendido, sindactilias e microtias, síndrome de Down, síndrome de Patau, anencefalia, cardiopatia | <input type="checkbox"/> Desnutrição grave e/ou obesidade (de acordo com caderneta da criança) |
| | <input type="checkbox"/> Intercorrências repetidas com repercussão clínica – após segunda internação |

4 – ANAMNESE E CONDUTA REALIZADA NA UNIDADE: _____

Exames solicitados obrigatórios (pedir para paciente levar exames laboratoriais e demais exames na consulta): _____

Medicação em uso: _____

Outras condutas: _____

Toledo, _____ / _____ / _____

Carimbo e Assinatura do Profissional